

తీటిటల సంరక్షణ మరియు నిర్వహణ:

- పశుగ్రాసానికి పనికి పన్నుంది కనుక మొదటి సంపత్తిరంగంలో మొక్కలను పశువులు మరియు వేకల బారి సుండి కాపాడాలి.
- సుబాబుల్ తోటకు ప్రతి 15 రోజులు లేదా సెలక్తి ఒకసారి నీటి లభ్యత మరియు నెల లో తేమశాతం బట్టి తడి ఇచ్చాలి.
- ఎరువుల వాడకం కనీసం మొదటి దెండు సంపత్తురాలు దెండు మూడు డోసుల్లో చేయాలి. మొక్క కాండం నుండి 10-15 సెంటీమీటర్లు దూరంలో, తగినంత నేలలో తేమ ఉన్నప్పుడు లేదా నేల పని మరియు కలువు తీయడం తర్వాత తేలికపాటి పరాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దీనిని మొక్క మంచు గుండ్రంగా వేసుకోవాలి.
- నెలలో మంచి వాయమిప్రసారణ, తేమ సంరక్షణ 2-3 సార్లు దున్నాలి. దున్నుతున్న సమయంలో మొక్కలను సంరక్షించుకోవాలి.
- సుబాబుల్ తోటని పశువుల నుండి రక్కించాలి. పశువులు లేదా మెక్కలు తోక్కుండా మరియు తీసుకుండా చూసుకోవాలి.
- వాయ లేదా ఎత్తులేని భూధాగంలో, పరుసలు ఆక్రమించండా ఇమసు సంరక్షింపడానికి మరియు భూధక్కయం నిటోంచడానికి ఆక్రముల వెంట పరుసల మధ్య దున్నుడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.



అంధ్రా పీపీలిపాప్లి

ఉపాయాలు:

శ్రీరామ్ సగర్, రాజమహింసంప్రదీవరం - 533 105.

యూఎస్ కడియం:

ఆంధ్రప్రదీయుల్ పలాయా, ఎమ్.ఆర్.ఎలెంటి - 533 126.
కడియం మండలం, తూర్పుజిల్లా, ఆంధ్ర.


APL Andhra Paper Limited



సుబాబుల్ తీటిటల ప్రయోజనాలు:

- సుబాబుల్ మంచి పిలక పంట. మట్టి నాటకుండానే దాని మొదలు నుండి మూడు సార్లు పంట పన్నుంది.
- సుబాబుల్ అనేది నెల సౌరాంస్ మెరుగుపరచడంలో సహాయపడే సైల్ఫోజన్ థ్రైంగర్ బాక్టీరియా సు వేరు బుడిపెలలో కలిగి ఉంటుంది.
- సుబాబుల్ ఒక అద్భుతమైన పశుగ్రాసంగా ఉపయోగ పడుతుంది.
- సుబాబుల్ను వివిధ రకాల నెలల్లో పెంచవచ్చు కానీ చాలా సరిఅయినది బంకపుట్టి నేల.
- ఉంచుపుండలల్లో భాగా పెరుగుతుంది.
- సుబాబుల్ను నీరు లభ్యమైన పరిస్థితిలో 3 సంపత్తురాలకు ఒకసారి పంటను పొందవన్ను.
- దీని కలపను కాగితపు గజ్జు గా మరియు కట్టలుగా ఉపయోగిస్తున్నారు.

విత్తన పద్ధతి:

- సుబాబుల్ విత్తనాలను సల్ఫ్‌రిక్ యాసిడ్ (H_2SO_4)తో చికిత్స చేసిన తర్వాత విత్తుతారు.
- 1 కేజి సుబాబుల్ నీడ్ కి 100 గ్రా. ఇనుకతో 50-75ml సల్ఫ్‌రిక్ యాసిడ్ ను 15-20 నిమిషాలు పొన్సిక్ బడెటలో కర్రష్ట పూర్తిగా కలాశాలి. ఇది గట్టి విత్తనపు పొరను త్వరగా విచ్చిన్నం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
- 



భాషమ తయారీ మరియు సుబాబుల్ విత్తనం విత్తు ఖాదానం:

- శోటోచేటర్ మరియు కలిచేటర్ తో దున్నిన తరువాత MB నాగరితో లోతుగా దున్నుకోవాలి.



పంట క్రిత (పంచమీంగ్)

- తోట 3-3.5 సంవత్సరాల పయన్నలో కోతకు సీదుగా ఉంటుంది. నేల మట్టం నుండి 10 సం.మీ పొందెను పడిలి ఏటువాలుగా ఉండే శీతిలో పదుషైన రంపంతో/గొడ్డలితో చెట్లను కత్తిరింపవచ్చి.

రెండప పంట



ముఖ్య గమనిక:

- మొదటి పంట కోసిన తర్వాత పుట్టి నాటాలిన అవసరం ఉండదు. కాబిన్ రెమ్ముల సహజ ఆవిధానం ఉంటుంది. పొరంభంలో, ఆన్ని ఉధ్వానించే రెమ్ములను మొదటి మాడు నెలలు పెరగడానికి అనుమతించాలి, తరువాత వాటిలో రెండు ఉత్తమమైన వాటిని ఎంచిక చేసి వాటిని పెంచాలి.
- తదుపరి సంపూర్ణాలలో తోటల నిర్వహణ మొదటి సారి విధంగానే ఉంటుంది.

- సుబాబుల్ను 1.5 మీ \times 1 మీ దూరం లో నాటువచ్చి.
- విత్తనం విత్తడానికి ఉత్తమ సమయం 1-2 ఇల్లుల తర్వాత వచ్చే రుతువువనాల ప్రోరంభం.
- సుది చేసిన విత్తనాన్ని విత్తడానికి ఉపయోగిసేరు. 2-3 పుట్టి చేసిన విత్తనాలను విత్తడానికి ఒకే చోట నాటాలి.
- విత్తనాలలో నేలలో తేమ తక్కువగా ఉంచే, వ్యాస్తరుగా తడి ఇచ్చాలి.
- సుబాబుల్ విత్తనం విత్తనం మొలకెత్తడం ప్రారంభమవుతుంది.
- ఒకసారి మొలక 15 - 20 సె.మీ విత్తకు చేరుకున్న తరువాత, వేగవంతమైన పెరుగుదల కోసం ఒక ఆరోగ్యకరమైన మొలకను ఉంచి విగతావాటిని విచ్చినాలను సుది చేయండి.
- విత్తనం విత్తనాలను శీలింద్ర సంపోరిష్ట్ విచ్చినాలను పూర్తిగా కలాశాలి.